

藥品類別	一般用醫藥類
藥效學分類	解熱鎮痛藥
產品名稱	リングルアイビー α 200 RINGL IBa200
產品功能	<ul style="list-style-type: none"> ●含有布洛芬的膠狀膠囊，能有效緩解頭痛、生理痛等疼痛或發熱症狀。 ●布洛芬的有效成份溶於液體中。
療效或效果	<p>1) 頭痛、牙痛、拔牙後的疼痛、咽喉痛、耳朵痛、關節痛、神經痛、腰痛、肌肉疼痛、肩膀痠痛、撞傷痛、骨折痛、扭傷痛、月經痛(生理痛)、外傷痛的鎮痛 2) 惡寒、發燒時的解熱</p>
用法及用量	<p>出現症狀時，請盡量避開空腹時，服用下述的1次服用量。服用間隔4小時以上。</p> <p><年齡：1次服用量：1天服用次數> 成人（15歲以上）：1顆：最多2次限制 未滿15周歲：請勿服用</p>
用法及用量相關的注意事項	<p>(1)請嚴格遵守規定的用法、用量。 (2)膠囊取出方式 將包覆膠囊的PTP凸起部分以指腹向下擠壓，內部鋁箔破開後取出藥劑服用。 (若不小心誤食可能造成刺穿食道黏膜等意外事故。)</p>
成分及分量	<p>每1膠囊 布洛芬：200mg：緩解頭痛、生理痛、牙痛等。發燒時的解熱。</p>
使用上的注意事項	<p>■禁止事項 (若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外) 1. 下列的人請勿服用 (1)曾因本藥劑或本藥劑的成份引起過敏症狀的人。 (2)曾服用本藥劑或其他解熱鎮痛藥、感冒藥，引發氣喘的人。 (可能引發氣喘) (3)未滿15歲的兒童。 (4)在醫療機構接受下列疾病的治療或接受藥物治療的人。 胃潰瘍/十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟病、腎臟病、心臟病、高血壓，服用齊多夫定（立妥威）治療的人。 (患有胃潰瘍/十二指腸潰瘍、肝臟病、腎臟病的人，可能引起該症狀的惡化) (患有有血液疾病的人可能引起白血球減少、血小板減少等，使該症狀更加惡化) (患有心臟病的人，可能使心臟功能障礙更加惡化) (患有高血壓的人，可能使血壓更上昇) (5)預產期12週內的孕婦。 2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。 其他解熱鎮痛藥、感冒藥、鎮靜藥 3. 服用前後，請勿飲酒 (一般而言，酒精能促進藥物吸收或代謝，並可能增加副作用和毒性，因此可能出現嚴重的肝功能損傷。) 4. 請勿長期連續服用</p> <p>■諮詢事項 1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者 (1)正在接受醫師或牙科醫師治療的人。 (2)孕婦或可能懷孕的人。 (3)正在哺乳的人。 (4)年長者。 (一般而言，年長者的生理功能較弱，因此副作用也較強。) (5)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。 (6)接受過下列診斷的人，或曾罹患下列疾病的人。 胃潰瘍/十二指腸潰瘍、血液疾病、肝臟病、腎臟病、心臟病、高血壓、支氣管哮喘（會誘發支氣管哮喘）、全身性紅斑性狼瘡（可能使腎功能障礙等疾病惡化，或出現無菌性腦膜炎）、混合性結締組織病（可能出現無菌性腦膜炎）、潰瘍性大腸炎、克隆氏症（曾有過使症狀惡化的報告） 2. 服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者 <關係部分：病徵> 皮膚：發疹、發紅，發癢，出現淤青 消化器官：噁心、嘔吐，食欲不振，胃部不適感，胃痛，口內炎，胸口灼熱，腹脹，胃腸出血，腹痛，腹瀉，血便 精神神經系統：頭暈，嗜睡，失眠，情緒鬱悶 循環器官：心悸 呼吸器官：氣短 其他：視力模糊，耳鳴，浮腫，流鼻血，牙齦出血，出血不易停止，出血，背痛，過度的體溫低下，身體倦怠</p>

	<p>極少可能引發下列嚴重症狀。該情況下，請立刻接受醫師的診療。</p> <p><症狀名稱：病徵></p> <p>休克（過敏性）：服用後馬上出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識模糊等。</p> <p>史蒂芬強森症候群、中毒性表皮壞死鬆解症：發高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣範圍發疹・發紅等持續，或者突然惡化。</p> <p>肝功能障礙：出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。</p> <p>腎功能障礙：出現發燒、發疹、尿量減少、全身浮腫、全身倦怠、關節痛（各關節疼痛）、腹瀉等。</p> <p>無菌性腦膜炎：出現伴隨脖子抽筋的劇烈頭痛、發燒、噁心・嘔吐等。（尤其是接受全身性紅斑性狼瘡或混合性結締組織病治療的人當中，許多人自訴這種症狀。）</p> <p>心肌梗塞：出現胸悶、呼吸困難、出冷汗等症狀。</p> <p>腦血管障礙：突然出現意識減退 / 意識喪失、單側肢體活動困難、頭痛、嘔吐、頭暈、說話困難、言語失用等症狀。</p> <p>氣喘：呼吸時發出呼呼聲、咻咻聲，出現呼吸困難等。</p> <p>再生不良性貧血：出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適，暈眩、血尿等。</p> <p>無顆粒性白血球症：出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。</p> <p>3. 服用後，可能出現下列症狀，這種症狀持續或變嚴重的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 便祕，口乾</p> <p>4. 服用後，有可能會出現體溫較平常低、無力（虛脫）、手腳冰冷（四肢冷卻）等症狀。該情況下，請立刻停止服用，並使用毛毯等保暖，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>5. 即使服用 3~4 次，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者</p>
添加劑	聚山梨醇酯 80，羥基化 K，明膠，琥珀酸化明膠，來自玉米澱粉的糖醇，梔子色素
保管及使用上的注意事項	(1) 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。 (2) 請保管於兒童拿不到的地方。 (3) 請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）。 (4) 請勿使用超過有效期限的產品。 (5) 由於膠囊容易受潮，故請注意不要用沾濕的手等觸摸。
其他	
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂 1-5-27
風險類別	指定第二類醫藥品
多語種產品信息的免責聲明	<ul style="list-style-type: none"> ・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。 ・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。 ・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。 ・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。