

藥品類別	一般用医薬品
藥效學分類	口內炎用藥
產品名稱	アフタッチ A AFTACH A
產品功能	是”貼式”口內炎治療藥。確實的保護口內炎，針對患部緩緩釋放藥效成份。 藥物貼附後暫時呈現果凍狀，漸漸的自然溶化後消失。
療效或效果	口腔潰瘍（口瘡）
用法及用量	按下述次數對每 1 個患部進行黏貼使用。  [年齡：1 天服用次數] 成人（15 歲以上） / 兒童（5 歲以上）對每 1 個患部，1 次 1 片、1 天 1~2 次將白色面朝向患部黏膜黏貼後使用
用法及用量相關的注意事項	<p>(1) 請嚴格遵守規定的用法、用量。</p> <p>(2) 由於本藥劑經一定時間後會自然溶解消失，故請勿勉強將其揭下。</p> <p>(3) 疼痛治癒後請停止使用。（已使用中的藥物無須揭下。）</p> <p>(4) 使兒童使用的情況下，請在家長的指導監督下使其使用。</p> <p>(5) 請勿用於不滿 5 歲的嬰幼兒。</p> <p>(6) 用於兒童時，黏貼後可能會被其用手指揭下，故請多加注意。</p> <p>(7) 本藥劑為口腔黏膜貼劑，故請勿內服。內服也不會有效果。</p> <p>(8) 若出現誤吞，請重新在患部黏貼藥物。萬一症狀發生變化或感到不安，請諮詢醫師、口腔醫師、藥劑師或登錄販賣者。</p> <p>(9) 本藥劑使用方法錯誤時可能出現無法牢固黏貼的情況，故請仔細閱讀使用方法並正確使用。由於有些使用部位可能會難以黏貼，當無法良好地黏貼時請諮詢醫師、口腔醫師、藥劑師或登錄販賣者。</p> <p>(10) 忘記使用時，請在想起後盡早黏貼。</p> <p>(11) 唾液潤濕本藥劑白色面後會使本藥劑黏貼效果變差，此時可用紙巾或紗布等在口腔炎的部位輕輕按壓，擦去唾液後重新黏貼藥品。</p> <p>(12) 將本藥劑黏貼在患部黏膜後，若以舌頭等用力舔舐，可能會導致其脫落，故請予以注意。</p> <p>(13) 片劑取用方法 請用指尖用力按下裝有片劑的 PTP 藥用鋁箔包裝的凸部，使其背面鋁箔破裂，取出片劑服用。 （若不慎連同鋁箔一同吞下，可能會造成刺傷食道黏膜等不可預期的事故。）</p>
成分及分量	每 1 錠 曲安奈德：0.025mg：鎮定患部發炎症狀，改善口內炎。
使用上的注意事項	<p>■ 禁止事項 （若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用）</p> <p>1. 下列的人請勿使用</p> <p>(1) 懷疑為感染性疾病的口腔炎患者。（請諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者）</p> <p>● 用紗布等擦拭後可輕易剝落的白斑擴散到口腔整體的人。（懷疑為念珠菌感染性疾病）</p> <p>● 患部有黃膿的人。（懷疑為細菌感染性疾病）</p> <p>● 口腔內多發米粒大~紅豆大小水皰的患者，口腔黏膜以外的口唇、皮膚處也有水皰、起疹的患者。（懷疑為病毒感染性疾病）</p> <p>● 出現發熱、食欲不振、全身倦怠感、淋巴結腫脹等全身症狀者。（懷疑為病毒感染性疾病）</p> <p>(2) 伴隨口腔內感染的人。 （由於有因使用類固醇製劑而導致感染性疾病病情惡化的報告，故請勿用於有牙槽膿腫、牙周炎等口腔記憶體在感染的部位。）</p> <p>(3) 即使使用 5 天也不見症狀改善的人。</p> <p>(4) 即使使用 1~2 天仍見症狀惡化的人。</p> <p>■ 諮詢事項</p> <p>1. 下列的人於使用前，請諮詢醫師、牙醫、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>(1) 正在接受醫師或牙科醫師治療的人。</p> <p>(2) 曾因藥品等，引發過敏症狀的人。</p> <p>(3) 孕婦或可能懷孕的人。</p> <p>(4) 正在哺乳的人。</p> <p>(5) 患部範圍過大（本藥劑無法完全覆蓋患部）的患者。</p> <p>(6) 年長者。</p> <p>2. 使用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止使用，攜帶此文件，諮詢醫師、牙醫、藥劑師或登錄販賣者</p> <p>&lt;關係部分：病徵&gt;</p> <p>口腔內：白斑（疑似念珠菌感染），患部出現黃色膿液（疑似細菌感染症狀），味覺異常、麻痺</p> <p>其他：過敏症狀（發疹、發紅、發癢、浮腫等）</p>

	<p>3. 使用本藥劑後，若出現下列症狀，則懷疑存在因感染性疾病所致的口腔炎或其他疾病所致的口腔炎，故請停止使用，並諮詢醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄販賣者。</p> <p>發燒、食欲不振、全身倦怠感、淋巴結腫脹、水皰（除口腔內以外）、發疹、發紅、發癢、本藥劑無法覆蓋的大範圍口腔內患部、眼睛痛、視力模糊、外陰部潰瘍</p>
添加劑	<p>羥丙基纖維素、聚羧乙烯、硬脂酸鎂、乳糖、羧甲基纖維素鈣、滑石、矽酸鎂鋁、黃色 5 號</p>
保管及使用上的注意事項	<p>(1) 請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處蓋緊。</p> <p>(2) 從 PTP 板中取出本藥品後請儘快使用。</p> <p>(3) 請保管於兒童拿不到的地方。</p> <p>(4) 請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質。）。</p> <p>(5) 請勿使用超過使用期限的製品。</p>
其他	<p>&lt;如何使用 AFTACHA &gt;</p> <p>1. 本藥物針對的「口內炎（口瘡性）」，是指在臉頰內側、舌或唇內側等有 1~數個周圍泛紅且中央部份淺淺空心的白色圓圈的小潰瘍（直徑 10mm 以下）引起的發炎症狀的總稱。</p> <p>2. 以面紙或紗布輕輕按壓口腔內發炎的部份，將唾液擦拭乾淨（貼附本藥劑的範圍若有唾液的話，可能會使藥物無法確實附著。）</p> <p>3. 指尖沾取少量唾液，再以指尖於本藥劑橘色面上輕按，使藥劑附著。</p> <p>4. 一面照鏡子，一面將白色面（含有主要成份）朝口內炎的部份小心的貼上。白色面若被唾液等沾溼的話，就無法確實的附著在患部上，因此，若無法黏貼時請再取一份新的藥劑重新貼附。</p> <p>5. 下列的部位，尤其是藥劑很難黏貼的部位，請以棉花棒代替指尖進類黏貼的動作。 舌頭內側、牙齦等表面凹凸不平的部份，若無法黏貼時請向醫師、牙科醫師、藥劑師或登錄經銷商諮詢。</p> <p>6. 藥劑貼附於口內炎的部位後，請按壓數秒鐘，確認藥劑已附著後手指即可放開。為使藥劑能確實附著，暫時勿以舌頭等接觸藥劑，請您留意。藥物貼附後暫時呈現果凍狀，漸漸地自然溶化後消失。</p>
生產銷售公司	<p>佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂 1-5-27</p>
風險類別	<p>指定第二類醫藥品</p>
多語種產品信息的免責聲明	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。</li> <li>・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。</li> <li>・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。</li> <li>・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。</li> </ul>