

药品类别	一般用医药品
药效分类	催眠镇静药
产品名称	パンセダン PANSEDAN
产品特点	<ul style="list-style-type: none"> ●植物性镇静药，添加高效镇静的生药。 ●淡绿色薄膜衣片，可缓解人前易紧张感、参加考试或会议时紧张情绪、戒烟或减肥期间烦躁情绪、以及伴随而来的头重和疲劳倦怠感。”
效能或效果	镇静烦躁、紧张、兴奋情绪，缓解伴随上述情绪的头重和疲劳倦怠感。
用法及用量	按照下述服用量服用。 <年龄：1次用量：1天使用次数> 成人（15周岁以上）：2片：2次 未满15周岁：请勿服用
用法及用量相关注意	(1)请严格遵守规定的用法、用量使用。 (2)片剂取用方法 请用指尖用力按下装有片剂的PTP药用铝箔包装的凸部，使其背面铝箔破裂，取出片剂服用。 （若不慎连同铝箔一同吞下，可能会造成刺伤食道黏膜等不可预期的事故。）
成分及分量	每4片中 西番莲提取物：160mg：原产于南美洲的藤蔓植物，茎、叶可入药，具有镇静作用。 欧洲槲寄生提取物：40mg：寄生于橡胶树、栎树上的常绿灌木，枝、叶、梢可入药，具有镇静作用。 钩藤提取物：90mg：野生于日本、中国的藤蔓植物，通常树刺可入药，具有镇静作用。 干啤酒花提取物：36mg：原产于欧洲、日本也有栽培的藤蔓植物，成熟果穗可入药，具有镇静作用。
使用注意事项	■禁止事项 （若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用） 1. 服用本药期间，请勿服用以下药物。 其他镇静药 2. 不要长期连续服用 ■咨询事项 1. 以下人群在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者 (1)正在接受医师治疗的人群 (2)孕妇或有其可能性的人群 (3)因药物等出现过过敏症状的人群 2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者 <关系部分：病征> 皮肤：起疹、发红，发痒 消化系统：恶心、呕吐，食欲不振 3. 5~6天后症状仍无改善则应中止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者
添加剂	磷酸氢钙、CMC、乳糖、纤维素、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素、氧化钛、聚乙二醇、叶绿素铜钠盐
保管及使用注意事项	(1)保管在避免阳光直射潮气小的阴凉场所。 (2)保管在儿童无法触及的地方。 (3)不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。 (4)请勿服用超过有效期的产品。
其他	
生产销售公司	佐藤制药有限公司 东京都港区元赤坂1丁目5番27号
风险类别	2类药品
多语种产品信息的免责声明	<ul style="list-style-type: none"> · 本产品以作为在日本国内进行销售及使用为目的，基于日本有关保证医疗药品、医疗器械等的质量、有效性及安全性的法律获得认可的医疗药品。 · 多语种产品资料是根据该产品的日文说明书翻译而成的，仅供参考。其资料并不保证所记载的内容及该产品本身符合日本以外国家的法律法规。 · 多语种产品资料由提供方（或本公司）临时翻译而成，未来可能不提前预告即进行修改或更改。 · 关于因为多语种产品资料的内容所引起的问题，提供方（或本公司）概不承担一切责任。