

藥品類別	一般用医薬品
藥效學分類	催眠鎮靜藥
產品名稱	パンセダン PANSEDAN
產品功能	●植物性鎮靜藥，添加高效鎮靜的生藥。 ●淡綠色薄膜衣片，可緩解人前易緊張感、參加考試或會議時緊張情緒、戒煙或減肥期間煩躁情緒、以及伴隨而來的頭重和疲勞倦怠感。
療效或效果	鎮靜煩躁、緊張、興奮情緒，緩解伴隨上述情緒的頭重和疲勞倦怠感。
用法及用量	按照下述服用量服用。 ＜年齡：1次用量：1天使用次數＞ 成人（15周歲以上）：2片：2次 未滿15歲：請勿服用
用法及用量相關的注意事項	(1)請嚴格遵守規定的用法、用量。 (2)片劑取用方法 請用指尖用力按下裝有片劑的PTP藥用鋁箔包裝的凸部，使其背面鋁箔破裂，取出片劑服用。 (若不慎連同鋁箔一同吞下，可能會造成刺傷食道黏膜等不可預期的事故。)
成分及分量	每4錠 西番蓮提取物：160mg：原產於南美洲的藤蔓植物，莖、葉可入藥，具有鎮靜作用。 歐洲槲寄生提取物：40mg：寄生於橡膠樹、櫟樹上的常綠灌木，枝、葉、梢可入藥，具有鎮靜作用。 鉤藤提取物：90mg：野生於日本、中國的藤蔓植物，通常樹刺可入藥，具有鎮靜作用。 幹啤酒花提取物：36mg：原產於歐洲、日本也有栽培的藤蔓植物，成熟果穗可入藥，具有鎮靜作用。
使用上的注意事項	■禁止事項 (若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用) 1.服用本藥期間，請勿服用以下藥物。 其他鎮靜藥 2.請勿長期連續服用 ■諮詢事項 1.下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 (1)正在接受醫師治療的人。 (2)孕婦或可能懷孕的人。 (3)曾因藥品等，引發過敏症狀的人。 2.服用後，出現下列症狀的情況下，有可能是副作用，請立刻停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者 ＜關係部分：病徵＞ 皮膚：發疹、發紅，發癢 消化器官：噁心、嘔吐，食欲不振 3.即使服用5~6天，症狀也沒有改善的情況下，請停止服用，攜帶此文件，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者
添加劑	磷酸氫鈣、CMC、乳糖、纖維素、硬脂酸鎂、羥丙甲纖維素、氧化鈦、聚乙二醇、葉綠素銅鈉鹽
保管及使用上的注意事項	(1)請保管於陽光直射不到濕氣少的陰涼處。 (2)請保管於兒童拿不到的地方。 (3)請勿換裝於其他容器（可能導致誤用或變質）。 (4)請勿使用超過有效期限的產品。
其他	
生產銷售公司	佐藤製藥有限公司 東京都港區元赤坂1-5-27
風險類別	2類藥品
多語種產品信息的免責聲明	・本產品為以日本國內銷售及使用為目的，是經確保日本醫藥品、醫療器材等之品質、有效性及安全性等相關法律所核准的醫藥品。 ・多國語言產品資訊為翻譯自該產品日語其仿單之內容，該資訊僅供參考，並不保證其記載內容及該產品本身符合日本以外之國家的法令規範。 ・多國語言產品資訊為本公司暫譯版本，日後有可能無預先通知而進行修訂或異動。 ・針對多國語言產品資訊其記載內容所引發之問題，本公司一概不負任何責任。